

## Hoja de resumen de comunicación

<b>Título</b> ¿ Mide la hospitalización evitable únicamente la calidad asistencial de los Centros de Salud?
<b>Responsable de la comunicación</b> José Luis Alfonso Sánchez
<b>Autores</b> Alfonso JL, Blasco S, Simarro F, Torregrosa R, Deus S, Tárrega M y Vila B. Consortio Hospital General Universitario de Valencia.
<b>Palabras clave</b> Calidad asistencial, hospitalización evitable, procesos sensibles a cuidados ambulatorios.
<b>Resumen</b> <b>Fundamento.</b> Las hospitalizaciones evitables (HE) son un conjunto de patologías en los que una atención primaria de salud efectiva y adecuada de acuerdo con la capacidad que la ciencia establece hubiera evitado su ingreso hospitalario. El objetivo del estudio fue determinar la influencia del tamaño del hospital en el nivel de HE en los hospitales públicos españoles. <b>Método.</b> Se estudiaron todos los ingresos por HE en hospitales públicos de enfermos agudos de España en el año 2000. Para el estudio por niveles de hospitalización se agruparon los ingresos de los hospitales de acuerdo con el tamaño en camas del hospital, así se incluyeron en el nivel 1 a hospitales que tenían como máximo 350 camas, en el nivel 2 a hospitales de hasta 700 camas, y en el nivel 3 a hospitales con más de 700 camas. <b>Resultados.</b> El número de ingresos de HE por cama fue de 3,37 en el nivel 1, de 4,01 en el nivel 2, y casi de 5 en el nivel 3, y sus estancias medias respectivas fueron de 7,2, de 7,8 y de 8,3 respectivamente. Estos enfermos también tuvieron una mayor estancia preoperatoria, con mayor comorbilidad ( $0,63 \pm 0,8$ ), e ingresaron fundamentalmente por urgencias y en hospitales de alta complejidad. Se observó una relación directa entre frecuentación por HE y complejidad del hospital. <b>Conclusiones</b> Se observó un efecto de inducción de la oferta hospitalaria.