

Hoja de resumen de comunicación

Título Dermatitis atópica (DA) en España: ¿La gravedad y la edad del paciente condiciona la utilización de recursos sanitarios directos?. Resultados del estudio DAES.
Responsable de la comunicación Montse Figueras. Novartis Farmacéutica S.A. montse.figueras@pharma.novartis.com Tef: 93 306 4408
Autores Figueras M ¹ , Espinosa C ¹ , Díaz JM ^{a1} , A. García ² , V. García-Patos ³ , J.G. Hachero ⁴ , I. Polanco ⁵ , C. Rodrigo ⁶ , A. Zambrano ⁷ y grupo estudio DAES 1. Novartis Farmacéutica S.A. Barcelona; 2. H. La Princesa. Madrid; 3. H. Vall d'Hebrón. Barcelona; 4. H. Virgen de la Macarena. Sevilla; 5. H. La Paz. Madrid; 6. H. Germans Trias i Pujol. Barcelona; 7. H. Niño Jesús. Madrid
Palabras clave Recursos sanitarios directos, Dermatitis atópica
Resumen Objetivo: La DA es una enfermedad crónica de la piel, que cursa en brotes y cuya prevalencia es alta durante la lactancia y la infancia. Cuantificar la utilización de recursos sanitarios directos en población infantil, puede aportar información relevante para la elaboración de guías del manejo de la DA. Material y métodos: Estudio observacional, ambispectivo y multicéntrico en pacientes pediátricos con DA, incluidos por muestreo consecutivo según criterios de Seymour (0-24 meses) o Hanifin&Rajka (25 meses-12 años). Se realizaron cuatro visitas, una basal y tres de seguimiento (3, 6, 9 meses). Se registraron las variables sociodemográficas y clínicas. La variable principal de gravedad de la DA fue el Investigator Global Assessment (IGA). Se cuantificó la utilización de recursos sanitarios debido a la DA, de forma retrospectiva en los tres meses previos a cada una de las visitas, mediante los datos de la historia clínica y las encuestas directas al cuidador del niño. Resultados: Los siguientes resultados se refieren a la visita basal y a los tres meses previos. Se evaluaron 369 pacientes, de los cuales 129(35%) correspondían al grupo de lactantes (0-24 meses). No se observaron diferencias entre ambos grupos de edad en el sexo ni en la distribución de la gravedad de la DA. El 17,1% presentaron una DA casi asintomática (IGA=0 o IGA=1), el 34,4% leve, el 37,9% moderada y el 10,6% grave o muy grave (IGA=4 ó IGA=5). El 76,69% de los pacientes requirieron en los últimos 3 meses visita del médico, pediatra ó dermatólogo principalmente; el 3,25% de enfermería; el 81,84% requirió tratamiento farmacológico y al 24,11% se le practicó alguna prueba analítica. El 17,61% acudieron de urgencia al médico, y el 12,73% al hospital. En general, se observa que la proporción de pacientes que utilizan recursos sanitarios aumenta con la gravedad de la DA. No se observan diferencias entre los dos grupos de edad analizados. Conclusión: Los resultados preliminares de este estudio indican, como a priori cabía esperar, que en nuestro ámbito la gravedad de la DA condiciona que los pacientes utilicen los recursos sanitarios de forma más intensa.

